



東大阪市公衆衛生協力会 会報

事務局 〒578-0941 東大阪市岩田町四丁目3番22-500号(希来里5階)

TEL 072-960-3804 Fax 072-960-3807 Email: koushueisei@koushueisei.com



年次総会・理事会開催 7月5日(水)

総会は14時から

理事会は同日13時30分から開催します

東大阪市民ふれあい祭りパレード

に参加しました！5月14日(日)開催

当協力は会員38名がふれあい祭りパレードに参加しました。コロナによる制限が解除されて初めての大型イベントで、沿道には多くの市民が集まっていました。



パレードが始まる前には雨も上がっていましたが、前日から続く天候不順で、今にも降り出しそうな空の下、プログラムは急ぎ足で進められ、予定より早いスタートになりました。

先頭は会長、副会長等が「東大阪市公衆衛生協力会」の横断幕を持ち、その後ろにはパフォーマンスを担当する近畿大学洗心のメンバー、そして公衆衛生協力会の会員が続きました。

パレードでは、各団体の特徴と訴えを掲載したプラカードを持ち、東大阪市における公衆衛生の向上及び健康で明るい生活環境の推進を市民の皆様と呼びかけました。天も私たちに味方したようで、無事パレードを終え、記念撮影が終了するのを待ち受けるように雨が本格的に降り始めました。

また、今年は新たに近畿大学洗心のメンバー「よさこい」の若い力によるパフォーマンスで、沿道の皆様から大変注目されるとともに、盛大な応援をいただきました。

ふれあい祭りのパレードは、暑すぎず寒すぎず、全員無事に気持ちよく役割を果たすことができた今年度最初の公衆衛生活動となりました。



先般開催しました三役会議(会長・副会長・会計監査)で、令和5年度の理事会及び総会の日程が次のとおり決定しました。

- 1 日時 令和5年7月5日(水)
午後1時30分 理事会
午後2時 総会
- 2 場所 希来里5階 市民プラザ多目的ホール
(岩田町4-3-22)
- 3 その他 今年度の理事会・総会への出席のご案内は各団体の理事及び代議員の皆様にご案内させていただきます。



アシナガバチについて



アシナガバチは比較的小となしく、巣を刺激したり直接ハチを触ったりしない限り攻撃してくることはほとんどありません。また、樹木などにつくアオムシ・毛虫などを捕食したりする有益な昆虫です。

巣のできた場所が日常生活に支障のないところであればそのまま放置していても構いませんが、日常生活に支障をきたす場所に巣を作っている場合は以下のことに注意して駆除してください。春先は巣がまだ小さく比較的簡単に駆除することができます。

駆除を行う前にアシナガバチかどうかしっかり確認しましょう。個人で駆除できない場合は専門業者に依頼(有料)しましょう。

アシナガバチの見分け方

飛んでいるハチを見て種類を特定することは難しいので、巣を見て判断しましょう。

アシナガバチが巣を作りやすい場所

春頃から活動が始まり、軒下や樹木など雨風をしのげる場所に巣を作ります。

巣は1年で使い捨てされます。捨てられた巣に再びハチが住み着くことはありません。

ただし、巣がある場所はハチにとって心地よい場所と考えられるので、毎年新たに巣ができる可能性があります。【(2)面へ続く】

昭和37年度～昭和53年度生まれの男性の皆様へ

あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう!

風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんが感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。

昭和37年度～昭和53年度生まれの男性の皆様には、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまう恐れがあります。

この年代の男性の皆様が抗体検査を受け、必要な予防接種を受けると、免疫を持っている人が増え、風しんの流行はなくなると言われています。あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種をお受けください!

【対象】昭和37年度～昭和53年度生まれの男性

【費用】抗体検査・予防接種共に無料

【方法】対象者にクーポン券をお送りしています。東大阪市に限らず、全国の委託医療機関で受診可能です。抗体検査・予防接種を受けられる医療機関リストは、厚生労働省ホームページ、二次元コードでご確認ください。



風しんの追加的対策 検索

【お問い合わせ】

東大阪市保健所 母子保健・感染症課 電話:072-970-5820

密閉して可燃ゴミとして出す。

ハチに刺されないためには・・・

- ◆巣に近づかない。
- ◆巣を刺激しない。(つついたり、振動を与えたりしない。)
- ◆洗濯物を取り入れる際は、ハチが付いていないか気をつける。
- ◆樹木の剪定をするときは、ハチの巣がないか確認してから行う。
- ◆家や車の中にハチが入ってきたときは、明るい方角の窓を開けて室内の照明を消し、刺激せずに出ていくのを待つ。

お問い合わせ先
東大阪市保健所 環境薬務課 環境担当
 〒578-0941東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里5階
 TEL:072-960-3804 FAX:072-960-3807

【(1)面より】

春先から注意していれば、巣の小さなうちに発見できます。

※このような場所に巣を作ります
軒下、植え込み、樹木のくぼみ、天井の中、カーポート、戸袋の中など



アシナガバチの巣の特徴

アシナガバチの巣は灰色(巣の材料によっては白色や茶色)で、シャワーヘッドのような形をしており、下から見ると六角形の穴が多数あいています。



初期のころのアシナガバチの巣

下から見ると六角形の穴がたくさん見える。ハチは巣の外側にくっついている。

アシナガバチの巣の駆除について

用意するもの

- ◆ハチ駆除用の駆除スプレー(殺虫剤)
※ホームセンターなどで販売しているハチ専用の駆除スプレーを使うと薬液が遠くまで飛ぶので安全です。使用する際は使用上の注意をよく読んでお使いください。
- ◆服装は**長袖・長ズボン・帽子・手袋・長靴**を着用し、**首にタオル**を巻く。
- ◆黒っぽいものは攻撃されやすいので、**白っぽい服装**にする。

注意事項

- ◆香水等は使用しない。(ハチが香りに寄ってきてしまいます。)
- ◆光に反応するので**ライトなどで巣を照らさない**。
- ◆死んだハチも針に毒が残っているため**素手で触らない**。
- ◆もしハチに刺されてしまった場合は、流水でよく洗い流して氷で冷やし、腫れがひどい場合や気分が悪くなった場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

駆除の方法

1. 作業は、ハチが巣に戻っている**日没後2～3時間後**に行う。
2. **風上から**駆除スプレーを巣に向けて5～10秒程度噴霧し、その場を離れる。
※噴霧するとハチが飛び散りますが、攻撃ではなく薬剤の影響です。殺虫剤が数秒でもかかると攻撃性はほとんどなくなって死にますので、**噴霧を続けてください**。
3. 翌朝、ハチがいらないことを確認し、巣を割りばしや棒などで落とす。
4. 落ちたハチや巣の残骸をほうき等で集め、**直接手で触れないようにして**袋に入れる。袋内にもう一度駆除スプレーを噴霧し、袋を